

ASA-RISKILUOKITUS ON SUOMENNETTU UUDELLEEN

► American Society of Anesthesiologists (ASA) on hyväksynyt esimerkkien osalta uudistuneet ohjeet anestesiariiskiluokituksista kokouksessaan 15.10.2014. Itse ASA-luokkien määritelmässä ei ole muutoksia, vaan muutokset ovat eri ASA-luokkiin liittyvissä esimerkkitaapauksissa. Muun muassa yli 65 vuoden ikä ei automaattisesti nosta ASA-luokkaa.

Koska Suomessa tarvitaan suomenkieliset ohjeet

anestesiariiskiluokituksista, me allekirjoittaneet anestesiologian ja tehohoidon koulutuksesta vastaavat professorit päätimme kääntää ohjeet suomen kielelle. Saimme käännös-apua dosentti Minna Tallgrenilta. Käännöksessä on yritetty noudattaa mahdollisimman tarkasti alkuperäistä ohjetta.

Olemme tietoisia, että anestesiariiskiluokituksen kielellinen asu voi herättää lukijoissa kysymyksiä. Tämä

on kuitenkin se versio, johon päädyttiin useiden kymmenien lukukertojen jälkeen. Nyt julkaistavan käännöksen on hyväksynyt myös Suomen Anestesiologiyhdistyksen johtokunta. ■

Riku Aantaa
Seppo Alahuhta
Klaus Olkkola
Matti Reinikainen
Arvi Yli-Hankala

ASA PHYSICAL STATUS CLASSIFICATION SYSTEM

Last approved by the ASA House of Delegates on October 15, 2014.
 Current definitions (NO CHANGE) and Examples (NEW)

ASA PS Classification	Definition	Examples, including, but not limited to:
ASA I	A normal healthy patient	Healthy, non-smoking, no or minimal alcohol use
ASA II	A patient with mild systemic disease	Mild diseases only without substantive functional limitations. Examples include (but not limited to): current smoker, social alcohol drinker, pregnancy, obesity (BMI 30-40), well controlled diabetes (DM) or hypertension (HTN), mild lung disease
ASA III	A patient with severe systemic disease	Substantive functional limitations; One or more moderate to severe diseases. Examples include (but not limited to): poorly controlled DM or HTN, COPD, morbid obesity (BMI ≥40), active hepatitis, alcohol dependence or abuse, implanted pacemaker, moderate reduction of ejection fraction, End-stage renal disease (ESRD) undergoing regularly scheduled dialysis, premature infant PCA < 60 weeks, history (>3 months) of myocardial infarction (MI), cerebrovascular accident (CVA), TIA, or coronary artery disease (CAD)/stents.
ASA IV	A patient with severe systemic disease that is a constant threat to life	Examples include (but not limited to): recent (< 3 months) MI, CVA, TIA, or CAD/stents, ongoing cardiac ischemia or severe valve dysfunction, severe reduction of ejection fraction, sepsis, DIC, ARDS or ESRD not undergoing regularly scheduled dialysis
ASA V	A moribund patient who is not expected to survive without the operation	Examples include (but not limited to): ruptured abdominal/thoracic aneurysm, massive trauma, intracranial bleed with mass effect, ischemic bowel in the face of significant cardiac pathology or multiple organ/system dysfunction
ASA VI	A declared brain-dead patient whose organs are being removed for donor purposes	

*The addition of "E" denotes Emergency surgery: (An emergency is defined as existing when delay in treatment of the patient would lead to a significant increase in the threat to life or body part)

<http://www.asahq.org/resources/clinical-information/asa-physical-status-classification-system>

ANESTESIARISKILUOKITUS (ASA-LUOKITUS)

Päivitetyt esimerkit hyväksyty Amerikan anestesiologiyhdistyksen
(American Society of Anesthesiologists) kokouksessa 15.10.2014

ASA-luokka	Määritelmä	Esimerkkejä (lista ei ole kattava)
ASA I	Terve	Terve, ei tupakoi, ei käytä alkoholia ollenkaan tai käyttää vain vähäisiä määriä.
ASA II	Lievä yleissairaus	Ei rajoita toimintakykyä merkittävästi. Tupakointi, kohtuullinen alkoholinkäyttö, raskaus, lihavuus (BMI 30-40), hyvässä hoitotasapainossa oleva diabetes tai verenpainetauti, lievä keuhkosairaus.
ASA III	Vakava yleissairaus	Rajoittaa toimintakykyä merkittävästi. Yksi tai useampi kohtalainen tai vakava sairaus. Esimerkiksi huonossa tasapainossa oleva diabetes tai hypertensio, keuhkohtaumatauti, sairaaloinen lihavuus (BMI \geq 40), aktiivinen hepatiitti, alkoholi-riippuvuus tai väärinkäyttö, implantoitu tahdistin, kohtalaisesti alentunut ejektiofraktio, säännöllinen dialyysihoito loppuvaiheen munuaissairauden vuoksi, keskonen, jonka raskauden keston ja syntymän jälkeisen kalenteri-ian summa on alle 60 viikkoa, yli 3 kk sitten sairastettu sydäninfarkti, aivoinfarkti, aivoverenvuoto tai TIA, yli 3 kk sitten tehty sepelvaltimoiden stenttaus tai sepelvaltimotauti ilman epästabieleja tapahtumia viimeisten 3 kk sisällä.
ASA IV	Jatkuvasti henkeä uhkaava vakava yleissairaus	Akuutti sydänlihasiskemia, vaikea läppävika, matala ejektiofraktio, äskettäin (< 3 kk) sairastettu sydäninfarkti, aivoinfarkti, aivoverenvuoto, TIA tai äskettäin (<3 kk) tehty sepelvaltimoiden stenttaus, sepsis, DIC, ARDS tai loppuvaiheen munuaissairaus ilman säännöllistä dialyysihoitoa.
ASA V	Kuolemansairas potilas, jonka ei odoteta jäävän henkiin ilman leikkausta	Rupturoitunut aortan aneurysma, henkeä uhkaava vamma, kallonsisäinen vuoto, jossa keskiviiva-siirtymä, suoli-iskemia ja samanaikainen vakava sydäntauti tai monielinvaurio.
ASA VI	Aivokuollut elinluovuttaja	

Finnanestissa
5/2015 julkaistussa
ASA-luokituksen suo-
mennoksessa oli pieniä
virheitä, joten julkai-
semme luokituksen
uudelleen.

Merkintä "E" ASA-luokan perässä tarkoittaa kiireellistä toimenpidettä (päivystys). Päivystyksestä on kyse silloin, kun viive hoidon aloittamisessa lisää merkittävästi kuoleman tai pysyvän vaurion riskiä.

Lähde: <http://www.asahq.org/resources/clinical-information/asa-physical-status-classification-system>