

# 1 Anafylaksia

Vakava yleistynyt yliherkkyyssreaktio, joka ilmenee yhtenä tai useampana peruselintoiminnon häiriönä

## Aloita tästä

- Tiedota muuta tiimiä**
  - Kuka johtaa?
  - Tarvitaanko apua?
- Lopeta altistavien aineiden anto**
- Varmista avoin hengitystie, anna 100% happea ja avusta tarvittaessa hengitystä**
- Nesteytä**
  - Kohota tarvittaessa potilaan jalkoja
- Anna adrenaliinia im/iv boluksin ja tarvittaessa aloita infuusio**
- Etene elvytystilanteessa elvytysprotokollan mukaan**
- Harkitse kortisonin ja antihistamiinin antoa**
- Ota seerumin tryptaasi heti kun mahdollista sekä 1-2 t ja 24 t oireiden alusta**
- Järjestä jatkovalvonta**
- Tee ilmoitus HUS:n anafylaksiarekisteriin**
  - Google: "hus anafylaksiarekisteri"

## Yleisimmät altisteet

<b>Antibiootit</b>	ASA / NSAID
<b>Lihasselaksantit</b>	Sytostaatit
<b>Lateksi</b>	Varjoaineet

## Oireet

Hengitys	Verenkierto	Iho
Bronkospasmi	Hypotensio	Punoitus
Yskä / stridor	Arytmia	Nokkosihottuma
Hypoksia	Elottomuus	Turvotus
Hengitystiepaine ↑		

## Lääkitys

<b>Adrenaliini</b>	bolus
<b>im</b>	aikuiset 0,5 mg
	lapset 6-12 v 0,3 mg
	lapset < 6 v 0,15 mg
<b>iv</b>	aikuiset 0,05-0,1 mg
	lapset 0,001 mg/kg

**iv-infuusio**  
0.04 - 0.1 µg/kg/min

## Hydrokortisoni

<b>iv</b>	aikuiset 250-1000 mg
	lapset 10 mg/kg

## Metyyliprednisoloni

<b>iv</b>	aikuiset 80-250 mg
	lapset 2 mg/kg

## Prometatsiini (Atosil®) 25 mg/ml

<b>iv</b>	aikuiset 1-2 ml (max 4 ml)
	lapset 0,5-1 ml