

4 Yllättävä vaikea hengitystie anestesiainduktion jälkeen

1-2 epäonnistunutta intubaatioyritystä ja vaikeutunut maskiventilaatio

Aloita tästä

- 1 Tiedota muuta tiimiä**
 - ▶ Kuka johtaa?
 - ▶ Tarvitaanko apua?
- 2 Hae videolaryngoskooppi ja vaikean hengitystien välineistö paikalle**
- 3 Maskiventiloi 100 %:lla hapella**
- 4 Optimoi potilaan pään ja hartioiden asento**
- 5 Aseta sopivan kokoinen nielutuubi tai nenänielutuubi**
- 6 Ota avustaja mukaan ventiloimaan**
- 7 Arvioi anestesian ja relaksaation riittävyys**
- 8 Tarkista välineistö (filteri, letkusto, APL-venttiili)**
- 9 Kun videolaryngoskooppi on paikalla, yritä intubaatiota ja muista:**
 - ▶ Kurkunpään kompressio alas ja oikealle
 - ▶ Bougie, ohjain
- 10 Yhteensä enintään 3 intubaatioyritystä**
 - ▶ + 1 lisäyritys kokeneen intuboitajan toimesta

Jos intubaatio epäonnistuu

- 11 Aseta LMA ja yritä ventiloida**
- 12 Vaihda tarvittaessa 1-2 kertaa LMA:n kokoa tai mallia**



Jos ventilaatio LMA:lla onnistuu

**Voidaanko jatkaa LMA:lla?
Fiberoskooppinen intubaatio LMA:n läpi?**



Jos ventilaatio LMA:lla epäonnistuu

- 13 Valmistele kirurgisen hengitystien välineistö**
- 14 Yritä viimeisen kerran maskiventiloida**



Jos maskiventilaatio onnistuu

Harkitse relaksaation kumoamista ja potilaan herättämistä



Jos maskiventilaatio epäonnistuu

- 15 Tee kirurginen hengitystie/koniotomia**