

1 Anafylaxi

Allvarlig allmän allergisk reaktion som framträder med en eller flera störningar i vitalfunktionerna

Börja här

- 1 Informera övriga i teamet**
 - ▶ Vem leder?
 - ▶ Behöver vi hjälp?
- 2 Avsluta administrationen av de ämnen som orsakat reaktionen**
- 3 Säkra öppen luftväg, ge 100% syre och stöd andningen vid behov**
- 4 Ge vätska**
 - ▶ Sätt patientens ben i högläge vid behov
- 5 Ge adrenalin im/iv som bolus och påbörja infusion vid behov**
- 6 Framskrid enligt återupplivningsprotokollet vid återupplivning**
- 7 Överväg administrering av kortison och antihistamin**
- 8 Ta serumtryptas genast då möjligt samt vid 1-2 och 24 timmar efter att symptomen börjat**
- 9 Ordna fortsatt övervakning**
- 10 Gör anmälan till HUS anafylaxiregister**
 - Google: "hus anafylaxiregister"

De vanligaste förorsakarna

Antibiotika	Asa / NSAID
Muskelrelaxantia	Cytostatika
Latex	Kontrastmedel

Symptom

Andning	Cirkulation	Hud
Bronkospasm	Hypotension	Rodnad
Hosta / stridor	Arytmi	Nässelutslag/ urtikaria
Hypoxi	Livlöshet	Svullnad
Luftvägstrycket ↑		

Medicinering

Adrenalin	bolus
im	vuxna 0,5 mg
	barn 6-12 år 0,3 mg
	barn < 6 år 0,15 mg
iv	vuxna 0,05-0,1 mg
	barn 0,001 mg/kg

iv-infusion

0.04 - 0.1 µg/kg/min

Hydrokortison

iv	vuxna 250-1000 mg
	barn 10 mg/kg

Metylprednisolon

iv	vuxna 80-250 mg
	barn 2 mg/kg

Prometatsin (Atosil®) 25 mg/ml

iv	vuxna 1-2 ml (max 4 ml)
	barn 0,5-1 ml