

5 Brand i operationssalen

Eld (rök, röklukt eller gnistor) ses vid patienten, draperingarna eller i patientens luftvägar

Börja här

1 Informera övriga i teamet

- ▶ Vem leder?
- ▶ Behöver vi hjälp?

2 Hämta brandsläckare

Brand i luftvägarna

3 Försök att släcka branden

- ▶ Avlägsna intubationstub eller annat antändbart material från luftvägarna
- ▶ Stäng gastillförseln
- ▶ Håll koksalt i luftvägarna

4 När branden är släkt

- ▶ Säkra andningsvägen och återställ ventilationen
- ▶ Undvik lustgas och minimera FiO₂
- ▶ Säkerställ att operationsområdet, dukar och kompresser inte brinner
- ▶ Undersök luftvägarna med fiberoskop för säkerhets skull med tanke på skador och främmande föremål

Annan brand än brand i luftvägarna

3 Försök att släcka branden

- ▶ Undvik lustgas och minimera FiO₂
- ▶ Avlägsna alla draperingar och antändbart på och i patientens närhet
- ▶ Kväv brinnande material med koksalt eller med dukar blötta med koksalt
- ▶ Om branden fortsätter använd CO₂-brandsläckare (minst skadlig för sår)
- ▶ Om branden ännu fortsätter utlös brandalarmet
- ▶ Evakuera patienten
- ▶ Stäng dörren till operationssalen och stäng av gastillförseln

4 När branden är släkt

- ▶ Återställ gastillförseln
- ▶ Utvärdera patientens skador på brandområdet och utvärdera skador på luftvägarna, om det handlar om en ointuberad patient
- ▶ Säkerställ att operationsområdet, dukarna och kompresser inte brinner

Använd inte för att släcka brand

- ▶ Alkoholbaserade lösningar
- ▶ Vätskor, om elektronisk apparatur brinner

Brandlarm

5 Utvärdera patientens tillstånd och planera fortsatta åtgärder

5 Ta i förvar material och apparatur som varit i kontakt med branden för kontroll