5 Brand i operationssalen

Eld (rök, röklukt eller gnistor) ses vid patienten, draperingarna eller i patientens luftvägar

Börja här

1. **Informera övriga i teamet**
   - ► Vem leder?
   - ► Behöver vi hjälp?
2. **Hämta brandsläckare**

Brand i luftvägarna

3. **Försök att släcka branden**
   - ► Avlägsna intubationstub eller annat antändbart material från luftvägarna
   - ► Stäng gastillförseln
   - ► För att kyla slemhinnorna, häll koksalt i luftvägarna:
     - vuxen 50 ml (max 150 ml), barn beroende på storlek 5–20 ml (max 50–100 ml)
4. **När branden är släkt**
   - ► Säkra andningsvägen och återställ ventilationen
   - ► Undvik lustgas och minimera FiO2
   - ► Säkerställ att operationsområdet, dukar och tuffrar inte brinner
   - ► Undersök luftvägarna med fiberoskop för

Annan brand än brand i luftvägarna

3. **Försök att släcka branden**
   - ► Undvik lustgas och minimera FiO2
   - ► Avlägsna alla draperingar och antändbart på och i patientens närhet
   - ► Kväv brinnande material med koksalt eller med dukar blötta med koksalt
   - ► Om branden fortsätter använd CO2-brandsläckare (VARNING! Användning av CO_2-släckare kan orsaka köldskador (-78 °C)!)
   - ► Om branden ännu fortsätter utlös brandalarmet
   - ► Evakuera patienten
   - ► Stäng dörren till operationssalen och stäng av gas tillförseln
4. **När branden är släkt**
   - ► Återställ gastillförseln
   - ► Utvärdera patientens skador på brandområdet och utvärdera skador på luftvägarna, om det handlar om en ointuberad patient
   - ► Säkerställ att operationsområdet, dukarna och tuffrarna inte brinner

Använd inte för att släcka brand

- ► Alkoholbaserade lösningar
- ► Vätskor, om elektronisk apparatur brinner

Brandlarm

5. **Utvärdera patientens tillstånd och planera fortsatta åtgärder**
5. **Ta i förvar material och apparatur som varit i kontakt med branden för kontroll**