5 Tulipalo leikkaussalissa

Tulta (savua, savun hajua tai leimahdus) havaitaan potilaassa, peitteissä tai potilaan hengitysteissä

Aloita tästä

1. **Tarvitaanko apua?**
   - ► Kuka johtaa?
2. **Hae palosammutin**

Hengitystietulipalo

3. **Yritä sammuttaa tulipalo**
   - ► Poista intubaatioputki ja muu syttyvä materiaali hengitysteistä
   - ► Lopeta kaasuvirtaus
   - ► Limakalvojen jäähdyttämiseksi kaada keittosuolaa hengitysteihin:
     - aikuinen 50 ml (max 150 ml),
       lapsi koon mukaan 5-20 ml (max 50–100 ml)
4. **Kun tulipalo on sammutettu**
   - ► Varmista hengitystie ja palauta ventilaatio
   - ► Vältä ilokaasua ja minimoi FiO_2
   - ► Varmista, että leikkausalue, liinat ja taitokset eivät pala
   - ► Tutki hengitystiet fiberoskoopilla vaurioiden ja vierasesineiden varalta

Muu kuin hengitystietulipalo

Yritä sammuttaa tulipalo

- ► Vältä ilokaasua ja minimoi FiO_2
- ► Poista kaikki peitteet ja palava materiaali potilaan päältä ja läheisyydestä
- ► Tukahduta palava materiaali keittosuolalla tai keittosuolalla kostutetulla harsolla
- ► Tulipalon jatkuessa käytä CO_2-palosammutinta (VARO! CO2-sammuttimen käyttö altistaa paleltumavammoille (-78 C)!)
- ► Tulipalon yhä jatkuessa laukaise palohälytys
- ► Evakuoi potilas
- ► Sulje leikkaussalin ovi ja kaasunsyöttö

Kun tulipalo on sammutettu

- ► Palauta kaasuvirtaus
- ► Arvioi potilaan vauriot paloalueella ja arvioi ilmatievauriot, jos kyseessä on intuboimaton potilas
- ► Varmista, että leikkausalue, liinat ja taitokset eivät pala

Älä käytä tulipalon sammutuksessa

- ► Alkoholipohjaisia liuoksia
- ► Nesteitä elektronisten laitteiden palossa

Palohälytys

5. **Arvioi potilaan tila ja tee jatkotoimintasuunnitelma**
6. **Ota talteen tulipalossa mukana olleet materiaalit ja laitteet tarkistusta varten**